

**NORME DA SEGUIRE DOPO UN INTERVENTO DI CHIRURGIA ORALE
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE PRESCRIZIONI FARMACOLOGICHE**

GHIACCIO

Applicare il ghiaccio esternamente in corrispondenza della parte operata solo nelle ore immediatamente successive all'intervento, con applicazioni della durata di circa 15/20 minuti ad intervalli di 45/50 minuti per un totale di 4 applicazioni.

SCIACQUI

Non eseguire alcun tipo di sciacquo per le prime 24 ore. Eventualmente sputare le piccole quantità di sangue presenti in bocca e bere qualcosa di fresco.

SANGUINAMENTO

Rimuovere la garza, posta in sede al termine dell'intervento, dopo 20-30 minuti.
In caso di successivo sanguinamento, riapplicare un tampone di garza inumidita e comprimere per 20/30 minuti. Qualora l'emorragia risultasse profusa e non dominabile, telefonare al nostro ambulatorio o, nelle ore notturne, ad un Pronto Soccorso.

ALIMENTAZIONE

Cibi liquidi o semisolidi freddi per le prime 24 ore. Successivamente cibi morbidi che non traumatizzino l'area operata. Evitare di bere bevande calde o alcoliche per le prime 24 ore.

IGIENE ORALE

Sospendere le manovre di spazzolamento per le prime 24 ore. Successivamente spazzolare le arcate dentarie non corrispondenti alla ferita chirurgica.

MODIFICAZIONI ESTERNE

Un gonfiore di entità variabile e/o un ematoma in corrispondenza dell'area operata fa parte dei normali processi di guarigione. Generalmente tale fenomeno compare in 2° - 3° giornata
